

# 為Love檢驗LTBI 擁抱健康守護愛

**潛伏結核感染(LTBI)**一旦發病成為結核病就有機會傳染給身邊最愛的人。別擔心!潛伏結核感染是可以治療的!

為了保護家人，請您把握時間在病菌沉睡時擊退它，參加LTBI檢驗不需要任何費用。接受完整治療還可以降低9成以上的發病機率，更可有效避免因罹患結核病需服用多種抗結核藥物所產生的不舒服。

別猶豫，趕快洽詢所在地縣市衛生局或衛生所報名參加健康方案吧!!



你有聽過潛伏結核感染(LTBI)嗎?

結核菌住在身體裡，平時沒有症狀，但發病就會咳嗽、發燒…，除了影響工作或生活，還可能會傳染給親密的家人！愛家人從照顧自己的健康做起！

主辦單位:

諮詢專線:



# 愛的3招，輕鬆保護家人

## STEP 1 認識潛伏結核感染(LTBI)

人們可能在不自覺中感染結核菌，感染後會進入結核菌的休眠期，這個階段稱為「潛伏結核感染」，日後受到壓力、懷孕、疾病讓免疫力下降，結核菌甦醒可能就會發病成為會傳染的「結核病」，所以我們要趁著結核菌休眠時，先擊退它！千萬不要等發病後，自己生病受苦，甚至傳染給親愛的家人喔！

### 結核病(TB)

### 潛伏結核感染(LTBI)

#### 症狀

咳嗽、胸痛、體重減輕、倦怠、食慾不振、發燒等。

無

#### 傳染

透過飛沫或空氣傳染給與病人同住一室的家人或親近接觸者。

不具傳染力，但終生有5-10%機會發病成結核病。

#### 治療

服藥2週後，大大降低傳染力，每日服藥至少6~9個月才能治癒。

有多種短程處方可供選擇，醫師會依個別狀態，給予適當處方。

治療副作用大。

完成治療可有效降低九成以上發病機會。

## STEP 2 趕快報名參加新住民健康方案

現在起，未曾接受過結核病或潛伏結核感染治療的民眾快來參加，同時把健康跟禮物帶回家！

## STEP 3 檢驗治療很簡單，還有專人貼心陪伴

只需抽血4c.c.，大約1-2週就可以知道檢驗結果



- 1.請依醫師預約時間回診追蹤。
- 2.服用短程處方治療，必須加入衛生單位提供的「都治」服務，每天由關懷員進行目視服藥，並協助治療上的問題處理。

## 治療中如果出現

頭暈 發燒 噁心 皮膚癢疹 右上腹疼痛 手腳麻 眼白及皮膚變黃 食慾不振 急性過敏反應

請主動告訴關懷員或衛生所護理人員，評估是否需儘速回診，以便醫師評估提供後續處理方式。