

Periksakan diri demi Love, miliki kesehatan dan lindungi jagai orang terdekat

infeksi laten tuberkulosis (ILTB) beresiko menyebar pada orang yang dicintai begitu bakteri aktif dan berubah jadi penyakit tuberkulosis. Tapi jangan khawatir! infeksi laten tuberkulosis dapat diobati!

Jaga keluarga dengan meluangkan waktu untuk melawan bakteri disaat mereka tidak aktif, ikuti tes ILTB ini secara gratis. Menerima pengobatan lengkap juga dapat menurunkan potensi terjangkit lebih dari 90%, dan dengan efektif menghindari ketidaknyamanan yang disebabkan dari pengonsumsi antibiotik tuberkulosis.

Jangan ragu, segera hubungi dinas kesehatan kota atau fasilitas kesehatan setempat untuk mendaftar pada program kesehatan ini.

Pernah mendengar tentang **infeksi laten tuberkulosis (ILTB)**? *Mycobacterium tuberculosis* hidup di dalam tubuh dan umumnya tidak bergejala, tapi saat bakteri mulai aktif, maka akan menyebabkan demam dan batuk... Selain mempengaruhi pekerjaan atau keseharian, penyakit ini juga dapat menular ke orang terdekat! Cintai keluarga Anda dimulai dari menjaga kesehatan sendiri!



Penyelenggara:

Hotline Konsultasi:



3 Jurus Cinta, Lindungi keluarga dengan mudah

STEP 1 Kenali infeksi laten tuberkulosis (ILTb)

Orang tanpa sadar bisa terinfeksi bakteri tuberkulosis. Paska infeksi, akan memasuki masa dorman tuberkulosis, tahap ini disebut "infeksi tuberkulosis laten", stres, kehamilan, dan penyakit kemudian akan melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan bakteri tuberkulosis menjadi aktif dan berubah menjadi "tuberkulosis" yang menular. Lawan TBC saat belum aktif! Jangan menunggu sampai sakit dan menderita, atau bahkan menulari anggota keluarga tercinta!

| | Tuberkulosis(TB) | infeksi laten tuberkulosis (ILTb) |
|-------------------|---|--|
| Gejala | Batuk, nyeri dada, penurunan berat badan, letih lesu, kehilangan nafsu makan, demam, dll. | Tidak ada |
| Penularan | Melalui droplet atau udara kepada anggota keluarga atau kontak dekat yang tinggal di ruangan yang sama dengan pasien | Tidak menular, tetapi seumur hidup memiliki peluang 5-10% untuk berkembang menjadi tuberkulosis. |
| Pengobatan | 2 minggu setelah konsumsi obat, tingkat penularan berkurang. Konsumsi obat setiap hari selama minimal 6 sampai 9 bulan untuk proses penyembuhan. Efek samping pengobatan berdampak besar. | Ada berbagai pengobatan jangka pendek yang dapat dipilih, dan dokter akan memberikan pengobatan yang sesuai dengan kondisi individu. Menyelesaikan pengobatan secara efektif dapat mengurangi peluang terjangkit lebih dari 90%. |

STEP 2 Segera daftarkan diri Anda untuk Program Kesehatan Penduduk Baru

Mari ikuti dan bawa pulang tubuh yang sehat serta hadiah bagi orang-orang yang belum pernah mendapatkan pengobatan TBC atau infeksi TB laten!

STEP 3 Pemeriksaan dan perawatannya sangat sederhana, akan ada staf terpercaya yang menemani Anda.

Hanya perlu mengambil darah 4cc, hasil tes akan keluar sekitar 1-2 minggu



1. Silakan ikuti janji temu dokter berikutnya
2. Untuk mengambil pengobatan resep jangka pendek, Anda harus mengikuti layanan "DOTS Directly Observed Treatment, Short Course" yang disediakan oleh dinas kesehatan. Setiap hari perawat akan mengawasi pemberian obat dan juga membantu seputar permasalahan pengobatan.

Jika timbul gejala selama pengobatan

- Pusing
- Sakit pada perut kanan atas
- Menguningnya bagian putih mata dan kulit
- Reaksi alergi akut
- Demam
- Tangan dan kaki mati rasa
- Kulit gatal
- Mual
- Kehilangan nafsu makan

Mohon berinisiatif untuk memberitahu staf perawat di fasilitas kesehatan agar dapat dicek apakah perlu cek kontrol sesegera mungkin, sehingga dokter dapat mengevaluasi dan memberikan perawatan lanjutan.